

【大腸がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	1コースの期間
FOLFIRI	イリテカン	150mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	d1	
BV+FOLFIRI	ヘパシス マフ	5mg/kg	d1	14日
	イリテカン	150mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
BV+mFOLFOX6	ヘパシス マフ	5mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
BV+IRIS	イリテカン	125mg/m ²	d1,15	28日
	ヘパシス マフ	5mg/kg	d1,15	
	S1	80-120mg/day	d1-14	
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	d1	
IRIS	イリテカン	125mg/m ²	d1,15	28日
	S1	80-120mg/day	d1-14	
XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	21日
	カヘンタビン	2000mg/m ² /day	d1-14	
BV+XELOX	ヘパシス マフ	7.5mg/kg	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
Pmab単独	カヘンタビン	2000mg/m ² /day	d1-14	14日
	パニツムマブ	6mg/kg	d1	
Pmab+FOLFOX	パニツムマブ	6mg/kg	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
Pmab+FOLFIRI	パニツムマブ	6mg/kg	d1	14日
	イリテカン	150mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
Cmab単独	セツキシマブ (初回)	400mg/m ²	d1	7日
	セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m ²	d1	
SOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	21日
	S1	80-120mg/day	d1-14	
BV+SOX	ヘパシス マフ	7.5mg/kg	d1	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	d1	
Cmab+FOLFOX	S1	80-120mg/day	d1-14	14日
	セツキシマブ (初回)	400mg/m ²	d1,d8	
	セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m ²	d1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	
Cmab+FOLFIRI	レボホリナート	200mg/m ²	d1	14日
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	d1	
	セツキシマブ (初回)	400mg/m ²	d1,d8	
RAM+FOLFIRI	セツキシマブ (2回目以降)	250mg/m ²	d1	14日
	イリテカン	150mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²	d1	
FOLFOXIRI	フルオロウラシル	2400mg/m ²	d1	14日
	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
	フルオロウラシル	3200mg/m ²	d1	
BV+FOLFOXIRI	ヘパシス マフ	5mg/kg	d1	14日
	イリテカン	165mg/m ²	d1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	d1	
	レボホリナート	200mg/m ²	d1	
XELIRI	フルオロウラシル	3200mg/m ²	d1	21日
	イリテカン	200mg/m ²	d1	
BV+XELIRI	カヘンタビン	1600mg/m ²	d1-14	21日
	ヘパシス マフ	7.5mg/kg	d1	
	イリテカン	200mg/m ²	d1	
	カヘンタビン	1600mg/m ²	d1-14	